



追加（3回目）接種と使用するワクチンについて

追加接種の対象

2回目のワクチン接種を終了した18歳以上の方
※接種対象となる時期に個別通知します。

使用するワクチン

☆ファイザー社のワクチン 1回量 0.3ml
☆武田/モデルナ社のワクチン 1回量 0.25ml

1・2回目に接種したワクチンの種類に関わらず、両方のワクチンが使用できます。


3回目の接種の安全性と効果

ファイザー社及び武田/モデルナ社の薬事承認において、3回目の接種後7日以内の副反応は、1・2回目の接種後のものと比べると、どちらのワクチンにおいても、一部の症状の出現率に差があるものの、おおむね1・2回目と同様の症状が見られました。

発現割合	ファイザー社(2回目→3回目接種後の症状)	武田/モデルナ社(2回目→3回目接種後の症状)
50%以上	疼痛(78.3→83.0%)、疲労(59.4→63.7%)	疼痛(88.3→83.8%)、疲労(65.4→58.7%) 頭痛(58.8→55.1%)
10 - 50%	頭痛(54.0→48.4%)、筋肉痛(39.3→39.1%) 悪寒(37.8→29.1%)、関節痛(23.8→25.3%)	筋肉痛(58.1→49.1%)、関節痛(42.9→41.3%) 悪寒(44.3→35.3%)、リンパ節症(14.2→20.4%)
1 - 10%	38度以上の発熱(16.4→8.7%) 腫脹(6.8→8.0%)、発赤(5.6→5.9%) リンパ節症(※)(0.4→5.2%)	38度以上の発熱(15.5→6.6%) 腫脹・硬結(12.3→5.4%) 紅斑・発赤(8.7→4.8%)

出典：特例承認に係る報告書

1・2回目接種でファイザー社ワクチンを受けた人が、3回目でファイザー社ワクチンを受けた場合と、武田/モデルナ社ワクチンを受けた場合のいずれにおいても、抗体価が十分上昇することが報告されています。



出典：Munro APS, et al. The Lancet. December 2021

医療機関によって使用するワクチンが異なりますので、事前に確認してから予約してください。

通知が届きましたら、できるだけWEBでの予約をお願いします。



WEB予約
説明
ページ

【問い合わせ先】

保健福祉課 電話：72-1212 城辺保健福祉センター 電話：73-7400